

brabet em manutenção

<p>NAC: um antídoto contra o envenenamento por paracetamol no Brasil</p>
<p>No Brasil, o N-acetilcisteína (NAC) é frequentemente utilizad
o como antídoto contra 🏀 o envenenamento por paracetamol, devido à {kO} capacidade em aumentar os níveis de glutathiona no fígado. A
lém disso, o NAC 🏀 é também usado no tratamento de DAP-A
LF e hepatite alcoólica grave, e na prevenção da IN.</p>
<p>O paracetamol é um analgésico 🏀 e antipirético eficaz, que pode aliviar dores, dores e febre. No entanto, uma overdose desse medicamento pode causar Danos graves 🏀 no fígado. Se uma pessoa experimentar uma overdose de paracetamol, a administração de NAC dentro de 10 horas pode ajudar 🏀 a reduzir o risco de lesões hepáticas associadas.</p>
<p>De acordo com publications médicas, o NAC é também administrado por via intravenosa 🏀 para outras indicações, tais como tratamento de insuficiência hepática aguda doença do fígado (DAH-ALF) e hepatite alcoólica grave, bem como 🏀 para prevenir a injúria renal aguda (INJ).</p>
<p>Embora a maioría das pessoas tomem paracetamol sem incidentes, as overdoses acontecem. Todos os 🏀 anos, milhares de pessoas nos EUA sofrem de efeitos tóxicos decorrentes de overdoses acidentais ou intencionais de paracetamol.</p>
<p>Em casos graves 🏀 de overdose de paracetamol, o NAC deve ser administrado o mais rápido possível. Os médicos geralmente recomendam a administração dentro 🏀 de 8 a 10 horas a seguir à ingestão. No entanto, mesmo que mais tempo tenha passado, o NAC pode 🏀 ainda ser benéfico se o fígado ainda não tiver sofrido danos graves.</p>
<p>Em alguns casos, as pessoas podem precisar de doses 🏀 altas de NAC para tratar a overdose de paracetamol. Em tais casos, o tratamento pode durar alguns dias. Em geral, 🏀 o NAC é bem tolerado, mas pode causar efeitos secundários leves, tais como náuseas, vômitos e febre.</p>
<p>Em qualquer caso, se 🏀 alguém suspeitar que tenha tomado uma overdose de paracetamol, deve procurar Rapidamente a assistência médica. O NAC deve ser administrado 🏀 o mais breve possível, preferencialmente dentro de 8 a 10 horas após a ingestão, para minimizar quaisquer danos hepáticos potenciais.</p>
<p>Em 🏀 resumo, o NAC é uma substância vital no tratame