

# br betano com foguete

O hormônio gonadotrofina coriônica humana (hCG) é uma hormona glicoproteica produzida durante a gravidez pela placenta, que tem como função principal manter o corpo lúteo ativo e, assim, manter a produção de progesterona, responsável por manter o revestimento uterino para que o embrião possa se desenvolver. O hCG pode ser detectado em plasma sanguíneo ou urina materna a partir de 5 a 10 dias após a fecundação, sendo uma das formas de se confirmar uma gravidez precoce.

A beta-hCG, também chamada de subunidade beta da gonadotrofina coriônica humana, é uma fração da molécula de hCG que pode ser detectada em exames laboratoriais, como a dosagem de hCG no sangue ou na urina. A concentração de beta-hCG duplica a cada 48-72 horas no início do embrião, sendo que nos primeiros dias de gestação a concentração é inferior a 1 UI/L. A partir da 5ª a 7ª semana de gestação, a concentração é superior a 10.000 UI/L.

Portanto, a beta-hCG é significativa que o nível de beta-hCG detectado no exame é de 6 mUI/mL (mil unidades internacionais por mililitro). Este resultado pode indicar uma gravidez muito inicial ou um aborto espontâneo. Em alguns casos, um nível baixo de beta-hCG pode ser relacionado a uma gravidez ectópica, em que o embrião se desenvolve fora do útero, geralmente em uma trompa de Falópio. Neste caso, é necessário um acompanhamento médico imediato.

-----

Autor: jamescall.com

Assunto: br betano com foguete

Palavras-chave: br betano com foguete

Tempo: 2024/7/31 6:01:59