

roleta de duas bolas

<p>Peg Tubo de Gastectomia Percutânea: O Que É e Como Cuidar</p>

<p>A Peg ou tubo de gastectomia percutânea é um tubo è macio colocado através da pele atéo estômago, o que permite que aliment os e líquidos entrem diretamente na barriga.</p>

<p>Este tipo è de tubo é útil em situações em que as pessoas têm dificuldades em comer ou beber por meios normais, como è no tratamento de constipação, em que o medicamento comumente usado é o polietileno glicol.</p>

<p>O polietileno glicol é um medicamento que è está na classe de laxantes, o que significa que ele ajuda a movimentar as coisas no intestino.&

lt;/p>

<p>Partes da Peg</p>

<p>Alçproa: serve è para fechar o tubo.</p>

<p>Bump: impede a queda do tubo.</p>

<p>Cuidados com a Peg</p>

<p>Existem maneiras adequadas de cuidar da Peg após a è cirurgia, a fim de garantir {k0} durabilidade e eficácia.</p>

<p>Manter o local da perfuração limpo e seco.</p>

<p>Verifique a presença de flip-flow è clamp para fechar o tubo.</p>

;/p>

<p>Não force a alimentação se a passagem for difícil o

u dolorosa, consulte um médico.</p>

<p>Perguntas Comuns</p>

<p>O que é um polietileno glicol?</p>

<p>É um medicamento que age como laxante e possui como funçã

o principal incentivar o movimento intestinal.</p>

<p>Qual a è finalidade da Peg?</p>

<p>Elle permet de faire entrer de la nourriture et des boissons directemen

t dans l'estomac, facilitant l'alimentation en général è pou

r ceux qui ont du mal a digérer ou a s'alimenter de manière normal

e.</p>

<p>Obs: Este artigo é uma tradução livre è resumida das

informações inseridas. Recomenda-se, na dúvida, consultar um pro

fissional da saúde. O conteúdo aqui exposto não pode ser è usad

o nem utilizado para fins comerciais. O custo de um polietileno glicol pode vari

ar entre R\$ 30,00 a R\$ 55,00 è reais dependendo do local e da quantidade. O va

lor da instalação da Peg pode variar entre R\$ 1 500,00 e è R\$ 7 000,

00, dependendo das clínicas e dos hospitais. Leia também overdose de l

axantes pode ser fatais, especialmente para as è pessoas que estão em uso

constante de laxantes afrouxantes e estimulantes. O uso exagerado deste medic

amento pode causar diarreia grave è perda de líquidos.</p>
