

# saque recusado onabet

Efeitos Colaterais do Onabet SD Lotion: O Que Você Precisa Saber

O Que é Onabet SD Lotion?

Onabet SD Lotion é uma solução tópica amplamente utilizada no tratamento de infecções fúngicas da pele, como o pé de atleta, tinea cruris, tinea corporis e outras condições causadas por fungos que invadem e crescem em tecidos saudáveis.

Quais os Efeitos Colaterais Possíveis?

O uso do Onabet SD Lotion pode resultar em alguns efeitos colaterais leves a moderados, incluindo queimaduras, formigamento, inchaço, irritação, vermelhidão, alongamento e de pequenos poros ou bolhas semelhantes a espinhas, tenosidade ou casacos soltos na pele tratada. Se qualquer um desses efeitos persistirem ou piorarem, entre em contato com seu médico ou farmacêutico imediatamente.

Efeitos Colaterais

Observações

Queimaduras

Podem ser causadas pela solução tópica em contato com a pele.

Formigamento

Podem ser sinais de alergia ou sensibilidade às substâncias

ativas na solução.

Inchaço

Indica a presença de uma inflamação na área tratada.

Em Que Momentos e Em Que Lugar Esses Efeitos Colaterais Ocorrem?

Esses efeitos colaterais geralmente ocorrem imediatamente após a aplicação da solução tópica em áreas afetadas para tratar as infecções fúngicas da pele. A pele tratada geralmente experimenta esses efeitos colaterais, que devem diminuir medida que o tratamento continua.

O Que Devem Fazer?

Se esses efeitos colaterais persistirem ou piorarem, entre em

contato com o seu médico ou farmacêutico. Eles podem aconselhar a suspender temporariamente o tratamento ou mudar para um remédio alternativo.

Dicas Adicionais

Nunca aplique o Onabet SD Lotion em uma lesão aberta ou ferimentos expostos.

O cuidado adicional da pele pode ser necessário para prevenir a secagem ou irritação adicionais, especialmente ao se exercitar ou n